

LSV 355: Sortenvergleich Wintertriticale zur Nutzung als Ganzpflanzensilage (GPS) Ergebnisse 2026 vom Standort Frankendorf, Landkreis Erding

Sorte	Trockenmasse	Frischmasse	Trockensubstanz-
	TM	FM	gehalt TS
	dt/ha	dt/ha	%
Tender PZO	155,1	419,7	37,0
Bicross	150,7	397,2	38,0
Promiso	142,6	397,4	35,9
Allrounder PZO	141,7	383,6	37,0
Rivolt	139,6	372,6	37,5
RGT Comebac	138,3	367,1	37,7
Trimobe	135,3	363,2	37,3
Elephantus PZO	134,3	354,5	37,9
Resolut PZO	130,3	351,4	37,1
Maikönig PZO	128,3	345,3	37,2
Mittel	139,6	375,2	37,2

Kulturverlauf: Saat am 14.10.2025, Herbizideinsatz im Herbst, mineralische Stickstoff-Düngung 125 kg N/ha
Zweimaliger Wachstumsreglereinsatz im April und einmaliger Fungizideinsatz im Mai
Sortenbedingt leichter Krankheitsbefall, kein Lager
Ernte mit dem Häcksler am 23.06.2026 im Stadium der Teigreife bis späten Teigreife

LSV 355: Sortenvergleich Wintertriticale zur Nutzung als Ganzpflanzensilage (GPS) Ergebnisse 2026 vom Standort Buchdorf, Landkreis Donau-Ries

Sorte	Trockenmasse	Frischmasse	Trockensubstanz-
	TM	FM	gehalt TS
	dt/ha	dt/ha	%
Maikönig PZO	161,5	416,4	38,8
Resolut PZO	160,5	411,8	39,0
Bicross	151,3	397,5	38,1
Allrounder PZO	149,5	387,2	38,7
Elephantus PZO	144,7	379,4	38,2
Promiso	142,8	392,9	36,4
Tender PZO	142,4	364,3	39,1
RGT Comebac	141,6	370,1	38,3
Trimobe	139,6	349,5	40,0
Rivolt EU	131,7	345,4	38,2
Mittel	146,6	381,5	38,5

Kulturverlauf: Saat am 15.10.2025, Herbizideinsatz im Herbst, mineralische Stickstoff-Düngung 151 kg N/ha
 Einmaliger Wachstumsreglereinsatz im April
 Kein Befall mit Krankheiten, kein Lager
 Ernte mit dem Häcksler am 24.06.2026 im Stadium der Teigreife bis späten Teigreife

LSV 355: Sortenvergleich Wintertriticale zur Nutzung als Ganzpflanzensilage (GPS) relativer Ertrag GPS Trockenmasse 2026

	Frankendorf	Buchdorf	Mittel
TS (%)	35,9-38,0	36,4 - 40,0	2 Orte
Sorte	Ertrag TM relativ		
Tender PZO	111	97	104
Allrounder PZO	102	102	102
Rivolt EU	100	90	95
Resolut PZO	93	110	102
Bicross	108	103	106
Elephantus PZO	96	99	98
Trimobe	97	95	96
Promiso	102	97	100
Maikönig PZO	92	110	101
RGT Comebac	99	97	98
Mittelwert TM dt/ha	139,6	146,6	143,1