

Sortenberatung Winterroggen 2019/2020

Bayern

Standard-Sorten	KWS Binntto KWS Eterno KWS Serafino EU SU Arvid EU SU Forsetti
Begrenzte Empfehlung	Dukato

Ergebnisdarstellung Winterroggen ‚Anbauggebiete Süd-Südwestdeutschland‘

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbauggebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbauggebiete für Winterroggen dargestellt.

Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

Verwitterungsstandorte Südost (17)
Fränkische Platten (21)
Tertiärhügelland/Gäu (22)
Jura/Hügelland (23)

Die Ertragsergebnisse der bayerischen Anbauggebiete werden um die Ergebnisse von Versuchsstandorten benachbarter Bundesländer mit vergleichbaren Boden-Klimabedingungen ergänzt und wegen der geringen Anzahl der Versuche in einer Großraumverrechnung ‚Anbauggebiete Süd-Südwestdeutschland‘ zusammengeführt.

Für das Erntejahr 2019 gingen Ergebnisse aus den Gebieten 16, 17, 19, 20, 21 und 22 ein.

Winterroggen ‚Anbaugebiete Süd-Südwestdeutschland‘

